

Ako MIH vyzerá?

Zuby postihnuté MIH majú veľmi typický vzhľad od chvíle, kedy sa objavia v ústach:

- celkom biele alebo žltohnedé matné škvrny, často nepríťažlivé
- citlivosť a/alebo bolesť v postihnutom zube
- často dochádza k rýchlej kazivosti zubov
- časti zuba sa môžu odlupovať



Obrázky: S láskavým dovolením Dr. P. Rouas, Francúzsko a Prof. C. Baroni, Taliansko

V akom veku vzniká?

Zuby, ktoré môžu byť postihnuté MIH sú po prerezaní, vo veku 5-7 rokov; je možné zistiť ju od tohto momentu. Mliečne zuby môžu mať rovnaký druh defektov; tie sa môžu prejaviť dokonca už v 2 rokoch!

Prečo to má moje dieťa?

Žiaľ, stále nevieme, čo spôsobuje MIH, takže zatiaľ neexistuje spôsob, akým MIH môžeme predchádzať. Ak je však dieťaťu diagnostikovaná MIH, je viac pravdepodobné, že ju budú mať aj súrodenci.

Prečo musím rýchlo konať?

Včasná intervencia a preventívne opatrenia sú potrebné, aby ste zabránili zbytočnej bolesti a strachu zo zubára. Z dlhodobého hľadiska sa tak znížia náklady, pretože neskoršie ošetrovanie môže spôsobiť potrebu invazívnejších a drahších postupov.

GC Tooth Mousse



GC MI Paste Plus



K dispozícii v 5 príchuťiach: vanilka, melón, jahoda, mentolová a Tutti-Frutti



Pečiatka lekára:

ZOLF SK 2004 - 02/19



1 zo 7 detí

trpí Molárovou-rezákovou hypomineralizáciou (MIH)

Čo je presne MIH?
Aký môže mať vplyv
na moje dieťa?

Prečo to má moje dieťa?

Čo môžem ako rodič urobiť?



GC logo

Čo je presne MIH?

MIH, tiež známa ako „syrové moláre“, je choroba, pri ktorej sa vonkajšia vrstva (sklovina) zubov stane jemnou a pórovitou.

Takéto zuby sú veľmi krehké a ľahko ich napadnú baktérie, ktoré spôsobujú zubný kaz. Vo vážnych prípadoch sa môžu dokonca lámať!

Na trvalom chrupe sa MIH vždy vyskytuje na prvých trvalých molároch a niekedy aj na rezákoch. V ojedinelých prípadoch môžu mať podobné symptómy aj mliečne zuby.



Aký to môže mať vplyv na moje dieťa?

Zuby s MIH sú často precitlivené. Na takýchto zuboch vznikne zubný kaz veľmi rýchlo, čo tiež spôsobuje bolesť. Bolesť je možné predchádzať tak, že zmeníte stravovacie návyky dieťaťa a dokonca aj spôsob umývania zubov.

Keď sú chorobou zasiahnuté aj rezáky, škvrny sú viditeľné počas sociálnej interakcie (počas rozprávania, usmievania sa). Môže to ovplyvniť sebaistotu Vášho dieťaťa.



Čo môžem urobiť ja ako rodič?

1. Navštívte zubára!

Chodte k zubnému lekárovi na zubné vyšetrenie. Včasné zistenie a intervencia sú dôležité!

Váš lekár vám vie pomôcť s nasledovným:



Informuje Vás a naučí Vaše dieťa, ako sa starať o svoje zúbky.

Nanesie ochrannú vrstvu pre zníženie citlivosti zubov.



Posilní zuby aplikovaním produktov na posilnenie zubnej skloviny.



Vytvorí výplň v prípade, že vznikol zubný kaz alebo došlo k narušeniu zuba.



Ponúkajte zdravú a zuby šetriacu stravu

Nemalo by sa často jesť alebo piť nápoje medzi jedlami, najmä nie také, ktoré obsahujú veľa cukru alebo kyseliny.

3. Kontrolujte zubnú hygienu Vášho dieťaťa

Zuby by sa mali umývať dvakrát denne zubnou pastou s obsahom správneho množstva fluoridov (spýtajte sa na to svojho zubára). Nezabudnite, že Vaše dieťa možno stále potrebuje pomoc s čistením zubov.


4. Posilňujte zuby doma s krémami GC Tooth Mousse alebo MI Paste Plus

GC Tooth Mousse a MI Paste Plus obsahujú zložku Recaldent™ získanú z prírodných mliečnych proteínov. Pomáha posilniť zuby s oslabenou sklovinou, ako napr. s MIH.



Oba typy sú bez laktózy, ale nemôžu ich používať pacienti s alergiou na mliečne proteíny.

MI Paste Plus obsahuje navyše fluoridy (900 ppm). Pred aplikáciou si pozorne prečítajte pokyny na použitie.



Tooth Mousse a MI Paste Plus nie sú určené na predaj v bežných obchodoch. Spýtajte sa svojho zubára, ako je možné ich kúpiť!

Prijmite opatrenia!

Teraz si naplánujte návštevu u zubára s Vaším dieťaťom!